



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

بیمارستان روانپزشکی کارگر نژاد

آشنایی با داروی

ریسپریدون

واحد آموزش پرستاری

گردآوری و تطارت:

زهرا ملایی، کارشناس ارشد پرستاری

کد بهوشور: KH-A-14

تابستان ۱۳۹۷

مصرف ریسپریدون در دوران بارداری و

شیردهی:

1. مصرف ریسپریدون در ۳ ماهه اول بارداری می تواند برای جنین مضر باشد. مانند ایجا مشکلات تنفسی، سوء تغذیه، اضطراب جنین و در صورتی که در دوره مصرف ریسپریدون متوجه شدید که باردار هستید، سریعاً به پزشک اطلاع دهید. از قطع ناگهانی و خودسرانه ریسپریدون خودداری کنید.
2. از طریق شیرمادر به بدن نوزاد منتقل می شود و می تواند به نوزاد آسیب برساند.



مصرف در سالمندان

1. بهتر است مصرف دارو با دوزهای پایین تر آغاز شود.
2. در بیماران با اختلال فراموشی مصرف این دارو توصیه نمی شود



لینک کانال سروش بیمارستان:

@amozesh.kargarnejad

نکات قابل توصیه در مورد ریسپریدون

1. برای کاهش احساس سبکی سر و سرگیجه، وضعیت خود را از حالت خوابیده به نشسته به آهستگی تغییر دهید.
2. ضمن مصرف دارو در انجام کارهایی که نیاز به هوشیاری بالا دارد مانند رانندگی احتیاط کنید.
3. قبل از مصرف سایر داروها بخصوص به صورت بدون نسخه، با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.
4. دارو را می توان بدون توجه به زمان غذا خوردن مصرف کرد.
5. در صورت قصد بارد/ر شدن، تا ۱۲ هفته بعد از تجویز آخرین دوز عضلانی دارو صبر کنید.

موارد احتیاط:

- ممکن است در طول مصرف ریسپریدون حساسیت شما نسبت به هوای سرد و گرم افزایش یابد. از قرار گرفتن در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم اجتناب کنید. در هوای گرم و هنگام فعالیت، آب زیاد بنوشید.
- از نوشیدن الکل در طول دوره درمان خودداری کنید. مصرف الکل می تواند باعث تشدید عوارض جانبی ریسپریدون شود.

ریسپریدون Risperidon

ریسپریدون دارویی که تجویز آن در دو دهه اخیر به شدت افزایش یافته است، برای درمان اختلالات روانی در بزرگسالان و کودکان مانند بیماری های اوتیسم، اختلال دو قطبی و اسکیزوفرنی استفاده می شود و در درمان علائم مثبت بیماری (حالت جنون، اختلال فکری، حالت تهاجم) و درمان علائم منفی بیماری (انزوا و گوشه گیری از جمع) کاربرد دارد.

توجه : اولین نشانه های بهبودی و تاثیرات داروی ریسپریدون معمولا بعد از ۴ هفته بروز می کند . در صورتی که در روزهای اول مصرف ریسپریدون نشانه ای از بهبودی مشاهده نکردید ، ناامید نشده و مصرف دارو را ادامه دهید . اگر بعد از ۶ هفته از شروع مصرف ریسپریدون نشانه ای از بهبودی مشاهده نکردید به پزشک خود اطلاع دهید .



عوارض جانبی احتمالی ریسپریدون:

بی قراری، نگرانی، عصبانیت، تاری دید، نقص عملکرد جنسی، گیجی، اختلال در قاعدگی، عوارضی چون بیقراری ذهنی و جسمی ، بی خوابی، افزایش ادرار، تغییرات خلقی ، خارش یا بثورات جلدی، درد پشت، عوارض قلبی عروقی، افزایش ترشح شیر، افزایش فعالیت غدد چربی، بی اشتهايي، اشکال در تنفس، افزایش یا کاهش حرارت بدن، تشنج، سختی در حرکت، سختی در کشش عضلات.



تداخل ریسپریدون با سایر داروها:

مصرف همزمان این دارو با داروهای دیگر ممکن است باعث خواب آلودگی و یا کند شدن سرعت تنفس در شما شده که می تواند باعث عوارض جانبی خطرناک و یا تهدید کننده زندگی شود.

قبل از مصرف قرص های خواب، داروهای ضد درد مخدر، داروهای تجویزی برای سرفه، شل کننده های عضلانی، یا دارو مصرفی برای درمان اضطراب، افسردگی، یا تشنج با دکتر خود مشورت کنید.

فراموش کردن دوز مصرفی:

به محض یادآوری دوز فراموش شده را مصرف کنید. اگر نزدیک به زمان مصرف نوبت بعدی دارو هستید دوز فراموش شده را مصرف نکنید و طبق برنامه مصرفتان نوبت بعدی را مصرف نمایید. برای جبران دوز فراموش شده مقدار بیشتری دارو مصرف نکنید.



مسمومیت با دوزهای بیش از اندازه:

در صورت مصرف بیش از اندازه دارو سریعاً در پی دریافت مراقبت های پزشکی اورژانسی باشید.

خواب آلودگی، افزایش میزان ضربان قلب، احساس سبکی در سر، ضعف و بی قراری در عضلات حرکتی چشم ها، آرواره، گردن و دهان از نشانه های مصرف دوزهای بیش از اندازه هستند.